

premiers stades de l'embryogenèse du xénope (xenopus laevis)

publié le 01.06.01 | par [michel delarue](#)

photographies commentées d'embryons de xénope (xenopus laevis), de la fécondation au stade blastula.

1. la ponte



figure 1 - oeufs de xénope juste après la ponte
au sortir de la femelle, les œufs non encore fécondés présentent des régions pigmentées et blanches correspondant respectivement à l'hémisphère animal et à l'hémisphère végétatif. la disposition aléatoire des œufs les montre sous leurs différents aspects. la dimension d'un œuf de xénope varie de 1,1 à 1,3 mm de diamètre.

auteur(s)/autrice(s) : michel delarue
licence : [pas de licence spécifique \(droits par défaut\)](#)

2. la fécondation



figure 2 - oeufs de xénope juste après la fécondation
une demi-heure après la fécondation, l'œuf de xénope s'oriente en fonction de la pesanteur. l'hémisphère végétatif, plus dense, s'oriente vers le bas, laissant apparaître à l'observateur l'hémisphère animal pigmenté. au centre de ce dernier, on remarque une tache claire appelée tache de maturation formée par le noyau de l'ovocyte avant la ponte.

auteur(s)/autrice(s) : michel delarue
licence : [pas de licence spécifique \(droits par défaut\)](#)



figure 3 - détail d'un oeuf de xénope après la fécondation
au centre de la tache de maturation, un point pigmenté marque l'emplacement où sont expulsés les globules polaires. ceci correspond au point géographique du pôle animal.

auteur(s)/autrice(s) : michel delarue
licence : [pas de licence spécifique \(droits par défaut\)](#)

3. la segmentation



figure 4 - oeufs de xénope :
segmentation stade 2 cellules
environ 2h30 après la
fécondation, le premier plan de
clivage de la première mitose
apparaît. il partage la cellule-
œuf en deux premières cellules
de taille identique. on parle de
segmentation totale et égale.

auteur(s)/autrice(s) : michel
delarue licence : [pas de licence
spécifique \(droits par défaut\)](#)




figure 5 - oeufs de xénope :
segmentation stade 4 cellules
le second plan de clivage
apparaît 20 à 25 minutes après
le premier plan de clivage et
perpendiculairement à celui-ci.
l'œuf est alors partagé en 4
cellules identiques.

auteur(s)/autrice(s) : michel
delarue licence : [pas de licence
spécifique \(droits par défaut\)](#)



figure 6 - oeufs de xénope :
segmentation stade blastula
par la suite, les plans de
clivage se succèdent et
découpent le volume de l'œuf
fécondé en plusieurs centaines
de cellules. à ce stade, le jeune
embryon porte le nom de
blastula.

auteur(s)/autrice(s) : michel
delarue licence : [pas de licence
spécifique \(droits par défaut\)](#)

4. segmentation ou clivage de l'œuf de xénope, depuis le stade 2 blastomères jusqu'au stade blastula

la galerie d'images ci-dessous regroupe les différentes étapes du clivage de l'œuf de xénope en cellules appelées blastomères.




figure 7 - différents stades de la segmentation de l'oeuf de xénope

les différents vues

chronologiques correspondent aux étapes suivantes de la segmentation :

a = 2 blastomères; b = 4

blastomères; c = 4 - 8

blastomères; d = 8

blastomères; e = 8 -16

blastomères; f = 16

blastomères.

g = 16 - 32 blastomères; h = 32

blastomères; i = 32 - 64

blastomères; j = 64

blastomères; k = 64 -

128 blastomères ; l = 128

blastomères.

m = 128 - 256 blastomères; n =

256 blastomères; o = 256 - 512

blastomères; p = 1024

blastomères; q = jeune

blastula; r = blastula.

auteur(s)/autrice(s) : michel

delarue licence : [pas de licence spécifique \(droits par défaut\)](#)

CRÉDITS

AUTEUR(S)/AUTRICE(S)

[michel delarue](#)

directeur du service biomédia de l'upmc.

MISE EN LIGNE

[gilles furelaud](#)

professeur agrégé de svt. il a été le responsable éditorial du site planet-vie de 2001 à 2004.

LICENCE DU TEXTE DE L'ARTICLE

