

la molécule du mois : les énoyl-coa carboxylases/réductases

publié le 20.03.25 | par [janet iwasa](#)

les énoyl-coa carboxylases/réductases sont des enzymes capables de fixer rapidement et efficacement le carbone.

la fixation du carbone est un processus biologique crucial qui transforme le dioxyde de carbone (CO_2), une molécule très abondante mais biologiquement inaccessible, en matière organique comme les sucres. la majeure partie de la fixation du carbone est réalisée par les plantes et les algues grâce à l'enzyme [rubisco](#). cependant, la rubisco est une enzyme relativement lente et peu efficace. cette faible efficacité a entraîné des adaptations évolutives chez les algues et les plantes, comme la production de grandes quantités de rubisco et leur stockage dans des organites spécialisés (par exemple les pyrénoides dans les chloroplastes). cette faible efficacité est en grande partie due à son affinité à la fois pour le dioxyde de carbone (CO_2) et le dioxygène (O_2), tous deux présents dans l'atmosphère terrestre. malgré diverses tentatives en laboratoire pour augmenter l'efficacité de la rubisco, des améliorations significatives restent difficiles à obtenir. la fixation du carbone n'est toutefois pas l'apanage des plantes et des algues. certaines bactéries et archées ont développé des voies alternatives de fixation du carbone qui ne dépendent pas de la rubisco. l'étude de ces systèmes peut fournir des connaissances sur la manière dont nous pourrions concevoir des systèmes synthétiques pour capturer et fixer le dioxyde de carbone de notre atmosphère [\[1\]](#).

1. un moyen plus efficace de fixer le carbone

une famille d'enzymes découverte récemment, les énoyl-coa carboxylases/réductases, que l'on trouve chez certaines espèces de bactéries et d'archées, catalyse la fixation du carbone à des vitesses exceptionnellement rapides. une énoyl-coa carboxylase/réductase provenant d'une bactérie du sol appelée *kitasatospora setae* (entrée de la banque de données sur les protéines (pdb) [6owe](#)) est représentée sur la figure 1 [\[2\]](#). contrairement à la rubisco, les énoyl-coa carboxylases/réductases ne reconnaissent pas l' O_2 comme substrat, évitant ainsi une éventuelle compétition avec le CO_2 . il est intéressant de constater que les énoyl-coa carboxylases/réductases sont jusqu'à 10 fois plus rapides que la rubisco dans la fixation du CO_2 . des études structurales récentes ont montré que les énoyl-coa carboxylases/réductases fonctionnent comme des homotétramères, chaque sous-unité pouvant se lier au CO_2 , au nadph (qui agit comme cofacteur et donneur d'électrons) et à une molécule de substrat (un énoyl-coa [\[1\]](#)). lors de la fixation du carbone, un ion hydrure (H^-) est transféré du nadph à la molécule de substrat. cette étape rend le substrat très réactif, ce qui lui permet de réagir avec le dioxyde de carbone lié pour former un nouveau produit (un ester d'alkyle-coa).





figure 1 - l'énoyl-coa carboxylase/réductase de *kitasatospora setae*
l'énoyl-coa carboxylase/réductase de *kitasatospora setae* (entrée pdb [6owe](#)) est un tétramère. le nadph, représenté en orange, agit comme donneur d'électrons, tandis que le substrat, une molécule d'énoyl-coa, est représenté en jaune.

auteur(s)/autrice(s) : janet iwasa et rcsb pdb licence : [cc-by](#) source : [rcsb pdb](#)

2. une synchronisation des enzymes

comment expliquer la vitesse et l'efficacité impressionnantes des énoyl-coa carboxylases/réductases dans la fixation du carbone ? des études récentes ont mis en évidence un mécanisme de synchronisation unique qui facilite cette catalyse rapide. l'énoyl-coa carboxylase/réductase tétramérique adopte une configuration en « paire de dimères », dans laquelle chaque sous-unité forme un dimère avec une sous-unité voisine, et les deux dimères s'assemblent dans une géométrie en forme de x. cette configuration particulière permet une action coordonnée pendant le cycle catalytique, comme le montre l'animation visible à la figure 2 [\[3\]](#). à l'état initial, vide (entrée pdb [6na3](#)), l'enzyme est symétrique, mais lorsqu'elle se lie au nadph (représenté en orange), le tétramère subit un changement de conformation (entrée pdb [6na6](#)). une sous-unité de chaque dimère se ferme de manière coordonnée, positionnant précisément le substrat (en jaune), le nadph et le dioxyde de carbone (qui n'apparaît pas dans l'animation) à proximité immédiate, entraînant la fixation du carbone (entrée pdb [6na4](#)). une fois la réaction terminée, les sous-unités s'ouvrent et libèrent le produit. cette libération déclenche la fermeture de la sous-unité partenaire au sein du dimère, ce qui déclenche le cycle de catalyse suivant. la commutation synchronisée entre les états ouvert et fermé est couplée à un mouvement de torsion du complexe enzymatique, qui pourrait améliorer la fixation du substrat et/ou la libération du produit. la synchronisation rapide et couplée des sous-unités de l'énoyl-coa carboxylase/réductase est considérée comme un facteur clé à l'origine d'une performance supérieure à celle de la rubisco.





3. regarder de plus près la fixation du carbone

vous pouvez utiliser par exemple le logiciel de visualisation de molécules disponible sur le site [pdb-101](#) pour explorer les différentes conformations de l'énoyl-coa carboxylase/réductase et examiner de plus près les résidus d'acides aminés possiblement impliqués dans la fixation du dioxyde de carbone (représentés en magenta sur la figure 3), ainsi que les résidus impliqués dans la coordination de la synchronisation enzymatique (représentés en vert sur la figure 3).




figure 2 - la structure d'une énoyl-coa carboxylase/réductase représentant les acides aminés possiblement impliqués dans la fixation du dioxyde de carbone (en magenta) et ceux impliqués dans la synchronisation enzymatique (en vert) le coenzyme nadph donneur d'électrons est représenté en orange tandis que le substrat (l'énoyl-coa) est représenté en jaune.

auteur(s)/autrice(s) : janet iwasa et rcsb pdb licence : [cc-by](#) source : [rcsb pdb](#)

4. pour aller plus loin

1. la rubisco est considérée comme l'une des enzymes les plus abondantes de la planète. elle est utilisée par les plantes et les algues pour fixer le dioxyde de carbone. pour en savoir plus, vous pouvez retrouver un article de la molécule du mois à ce sujet : [molécule of the month : rubisco](#).
2. les cyanobactéries utilisent également la rubisco, en stockant plusieurs copies de l'enzyme dans un organite appelé carboxysome. pour en savoir plus, vous pouvez retrouver un article traduit de la molécule du mois à ce sujet : [la molécule du mois : les mécanismes de capture du carbone](#).

3. les études citées dans cet article ont tiré parti des techniques de cristallographie résolue en temps[2], qui ont également été utilisées pour étudier d'autres enzymes qui catalysent rapidement des réactions, y compris des [protéines activables par la lumière](#).

ce texte correspond à la traduction par cédric bordi de l'article [molecule of the month : énoyl-coa carboxylases/reductases](#) [4] écrit par janet iwasa et paru en mars 2025 sur le site [pdb-101](#), le portail éducatif de la base de données sur les protéines ([pdb](#)). les notes de bas de page correspondent à des ajouts du traducteur.

CRÉDITS

AUTEUR(S)/AUTRICE(S)


[janet iwasa](#)

janet iwasa est professeure assistante au département de biochimie de l'université de l'utah (états-unis). elle est spécialiste de la création d'images et d'animations permettant de rendre compte des processus biologiques.

LICENCE DU TEXTE DE L'ARTICLE



PARTENAIRE(S)



cet article est publié en partenariat avec le site [pdb-101](#), le portail éducatif de la base de données sur les protéines ([pdb](#)).

[pdb-101](#)

notes

1

l'énoyl-coa correspond à une molécule d'acyl-coenzyme a (coenzyme a lié à un groupement acyle r-co-, avec r une chaîne carbonée) dans laquelle l'acyle contient une double liaison carbone-carbone.

2

la cristallographie résolue en temps est une méthode de cristallographie aux rayons x permettant de déterminer la structure des protéines et de suivre leur dynamique en temps réel.

bibliographie

1

schwander, t. ., von borzyskowski, l. s., burgener, s. ., cortina, n. s., & erb, t. j. (2016). a synthetic pathway for the fixation of carbon dioxide in vitro. *science (new york, n.y.)*, 354, 900-904. <http://doi.org/10.1126/science.aah5237> (original work published 2026)

2

stoffel, g. m. m., saez, d. a., demirci, h. ., vögeli, b. ., rao, y. ., zarzycki, j. ., ... erb, t. j. (2019). four amino acids define the co2 binding pocket of enoyl-coa carboxylases/reductases. *proceedings of the national academy of sciences of the united states of america*, 116, 13964-13969. <http://doi.org/10.1073/pnas.1901471116> (original work published 2026)

3

demirci, h. ., rao, y. ., stoffel, g. m., vögeli, b. ., schell, k. ., gomez, a. ., ... wakatsuki, s. . (2022). intersubunit coupling enables fast co2-fixation by reductive carboxylases. *acs central science*, 8, 1091-1101. <http://doi.org/10.1021/acscentsci.2c00057> (original work published 2026)

4

iwasa, j. . (2025). enoyl-coa carboxylases/reductases. *rscb protein data bank*. http://doi.org/10.2210/rcsb_pdb/mom_2025_3 (original work published 2026)