

Jeunes épeires diadème

Publié le 25.06.09 Par [Michel Delarue](#)

Cet article présente le comportement de jeunes araignées de l'espèce épeire diadème, *Araneus diadematus*.

Après l'éclosion (mi-mai), les jeunes épeires diadème se rassemblent.



Figure 1 - Rassemblement de jeunes épeires diadème

Auteur(s)/Autrice(s) : Michel Delarue
Licence : [Pas de licence spécifique \(droits par défaut\)](#)

Le rassemblement des jeunes épeires se fait au sein d'un feutrage de fils de soie d'araignée.



Figure 2 - Feutrage accueillant le rassemblement des jeunes épeires

Auteur(s)/Autrice(s) : Michel Delarue
Licence : [Pas de licence spécifique \(droits par défaut\)](#)

Après quelques jours d'un comportement grégaire, les jeunes araignées commencent leur dispersion et leur vie autonome.



**Figure 3 - Dispersion des jeunes
épeires diadème**

Auteur(s)/Autrice(s) : Michel Delarue

Licence : [Pas de licence spécifique \(droits
par défaut\)](#)

CRÉDITS

AUTEUR(S)/AUTRICE(S)

[Michel Delarue](#)

Directeur du service BioMédia de l'UPMC.

MISE EN LIGNE

[Gilles Camus](#)

Professeur agrégé de SVT. Il a été le responsable éditorial du site Planet-Vie de 2004 à 2016.

LICENCE DU TEXTE DE L'ARTICLE

